

Ваш водич за лекот ЕYLEA



ЕYLEA се користи
за третман на
макуларен едем
заради оклузија
на централната
ретинална вена
(ОЦРВ)



EYLEA®

раствор за инјекција (afibercept)



Оваа брошура е наменета само на пациентите на кои им е препишан лекот ЕYLEA раствор за инјекција (afibercept).



Добредојдовте

во Вашиот водич за лекот ЕYLEA

Лекарот Ви го препишал лекот ЕYLEА бидејќи Ви е дијагностицирана оклузија на централната ретинална вена или ОЦРВ

Тоа е состојба поради која имате потешкотии со видот. Лековите како што е ЕYLEA можат да го спречат влошувањето на Вашиот вид и може да ги подобрат некои од симптомите кои ги имате.

Оваа брошура исто така содржи и аудио ЦД на кое се наоѓаат сите информации кои се содржани во оваа брошура.

Оваа брошура и приложеното ЦД се осмислени за да одговорат на сите прашања кои би можеле да ги имате, за да го добиете најдоброто од Вашето лекување.

Установа во која се лекувате:

Контакт: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

E-mail: _____

Во оваа брошура ќе најдете:

Информации кои ќе Ви помогнат да разберете за ОЦРВ

- Што е ОЦРВ?
- Кои се причините за појава на ОЦРВ?
- Совети за живот со ОЦРВ

Што да очекувате од лекот EYLEA?

- Што е EYLEA?
- Како ќе го примам лекот EYLEA?
- Што ако имам прашања во врска со лекот EYLEA?

Како да се грижите за очите, по примање на лекот EYLEA?

- Што можам да очекувам?
- Кога повторно треба да го примам лекот EYLEA?
- Дали лекот EYLEA има несакани ефекти?

Брошурата содржи
календар кој ќе Ви
помогне да го следите
лекувањето и закажаните
термини за примање на
лекот EYLEA






ШТО е ОЦРВ?

**Оклузија на централната ретинална вена
е состојба која го оштетува Вашиот вид
со блокирање на протокот на крв во и од
мрежницата, во позадината на Вашето око.**

Мрежницата е дел од окото каде се формираат сликите кои ги гледате – таа има улога на филм во фотоапарат.

Блокадата го спречува дотокот на крв во и од мрежницата, што може да го оштети Вашиот вид и како последица да доведе до слепило и болка во очите.





ШТО

ја предизвикува ОЦРВ?

Оклузија на централната ретинална вена може да настане на било која возраст, но најчеста е кај постарите од 65 години.

Кај повеќето пациенти со ОЦРВ не е можно да се одреди специфична причина за појава на болеста, но обично настанува како последица од други состојби како што се зголемениот очен притисок (глауком), хипертензијата (зголемен крвен притисок) или шеќерната болест.

Други околности кои можат да го зголемат Вашиот ризик за појава или влошување на ОЦРВ се факторите кои се поврзани со стилот на живот, вклучувајќи го пушењето и прекумерната телесна тежина. Откажувањето од пушењето во голема мера го намалува ризикот од оштетувањето на очите, а истовремено го подобрува општото здравје. Ако имате прекумерна телесна тежина, губењето на тежината и поздравата исхрана можат да помогнат да се заштити Вашиот вид. Вашиот матичен лекар може да Ви помогне во откажувањето од пушењето и во губењето на тежината.

Најдобро што можете да направите за да го заштитите Вашиот вид е да ги следите упатствата на Вашиот лекар и да водите сметка да дојдете на сите закажани термини.





Како се лекува ОЦРВ?

Постојат неколку можности за лекување на ОЦРВ кои делуваат на различни начини

Некои од овие третмани делуваат така што ги стеснуваат и затвораат слабите крвни садови, како би се спречило нивното блокирање. Другите начини на лекување се насочени кон намалување на отокот и ублажување на болката.

Бидејќи не постојат две еднакви лица, така не постои и универзално решение.

Вашиот лекар ќе Ви го одреди лекувањето кое најмногу одговара на вашите индивидуални потреби





ШТО е EYLEA®?

**EYLEA е вид на лекување, позната
како анти - ВЕФР**

Тоа е кратенка за анти-васкуларен ендотелен фактор на раст и го опишува начинот на кој EYLEA го штити Вашиот вид. EYLEA го блокира протеинот потребен за создавање на нови крвни садови во Вашето око. На тој начин EYLEA може да го спречи создавањето на слаби крвни садови, со што Вашиот вид може да се подобри или да се спречи неговото влошување.

EYLEA е раствор (течност) која се вбризгува во окото. Иако е разбираливо дека Ве загрижува тоа што се работи за инјекција, повеќето пациенти кои го примиле лекот EYLEA велат дека инјекцијата е безболна и звучи полошо отколку што навистина е.





За кого е наменета EYLEA®?

EYLEA е наменета за луѓе кај кои е дијагностициран ОЦРВ

Пред да започнете да го примате лекот EYLEA, важно е да му кажете на лекарот или на медицинската сестра, доколу:

- Имате воспаление на окото или околу окото
- Во моментот имате црвенило во окото или чувствувате било каква болка во окото
- Мислите дека сте алергични на јод, било кои лекови против болки или на некоја од состојките на лекот EYLEA
- Сте имале било какви проблеми со претходните инјекции во око
- Имате глауком или сте имале зголемен очен притисок
- Имате или некогаш сте имале блесок на светлина или „мушички“ во видот
- Земате било какви други лекови кои се издаваат со или без лекарски рецепт
- Сте бремени, планирате бременост или доите. Нема искуство на примена на лекот EYLEA кај трудници. EYLEA не смее да се применува кај трудници, разговарајте за тоа со Вашиот лекар пред започнување на лекувањето. Жените во репродуктивниот период мора да користат ефикасна контрацепција во текот на лекувањето и најмалку три месеци по последната инјекција од лекот EYLEA.
- Сте имале или се планира операција на окото во тек на 4 недели пред или по терапијата со EYLEA.



Како да се подготвам за закажаниот термин за лекот EYLEA?

Вашиот лекар можеби ќе бара од вас неколку дена пред закажаниот термин да користите капки за очи. По примена на лекот, видот може да Ви биде заматен и не би смееле да возите сами до дома. Побарајте помош од пријател или член на семејството или обезбедете превоз на друг начин. На денот на закажаниот термин не користете шминка.

Што можам да очекувам на закажаниот термин за лекот EYLEA?

Лекарот или медицинската сестра ќе Ве подготват за примање на лекот EYLEA. Тие се обучени професионалци со искуство во лекувањето на ОЦРВ. Тие знаат дека начинот на примање на лекот може да звучи застрашувачки и ќе се погрижат да бидете опуштени и да се чувствуваате удобно.

Ќе Ви бидат дадени капки за очи кои делуваат како локален аналгетик и ќе биде употребено средство за чистење на окото и кожата околу окото. Вашето лице ќе биде покриено со специјална прекривка, а окото ќе биде отворено. Капките за очи ќе го заматат Вашиот вид и затоа нема да можете да ја видите иглата.

Искусен лекар ќе Ви даде инјекција во белката од окото. Повеќето пациенти велат дека инјекцијата е безболна, а некои велат дека чувствуваат лесен притисок. Целата процедура може да се почувствува како малку непријатна, но ќе заврши за неколку минути.



Што ако сум загрижен/а или имам прашања?

Ако сте загрижени или имате било какви прашања, најдобро е да се јавите кај Вашиот лекар или медицинска сестра. Тие имаат искуство и ја знаат вашата индивидуална состојба и се во можност да Ви ги дадат одговорите кои Ви се потребни.

Не колебајте се да прашате или да ја изразите загриженоста. Вашиот лекар или медицинска сестра може да Ви одговорат и да Ве охрабрат.

Што можам да очекувам после закажаниот термин за лекот EYLEA?

Можеби лекарот ќе Ви направи некои прегледи на окото после инјекцијата. Прегледите опфаќаат и воздушен млаз што го мери притисокот внатре во окото. После инјекцијата, видот ќе Ви биде заматен и не би смееле да возите додека видот не ви се врати во нормала.

Во следните неколку дена можете да имате закрвавено око или да гледате подвигни точки во видното поле. И двете би требало да Ви поминат во рок од неколку дена, но ако не поминат или се влошат, јавете се кај Вашиот лекар.

Некои луѓе може да чувствуваат блага болка или непријатност во окото после инјекцијата. Ако тоа не помине или се влоши, јавете се кај Вашиот лекар.





Кога повторно треба да закажам термин?

Вашиот лекар ќе Ви го закаже следниот термин за лекот EYLEA. Распоредот на термини ќе биде направен така да одговара на вашите индивидуални потреби.

Запомнете, ако имате прашања во врска со Вашиот третман, најдобро е секогаш да разговарате со Вашиот лекар или медицинска сестра.

Советувајте се со Вашиот лекар пред да прекинете со лекувањето.

Кога ќе го закажете
новиот термин, немојте да
заборавите да го забележите
на задната страна на оваа
брошура, како потсетник





Дали лекот EYLEA има несакани ефекти?

Како и сите лекови, независно од тоа дали се издаваат на рецепт или без рецепт, EYLEA може да предизвика несакани ефекти. Тие нема да се појават кај секого што го прима лекот EYLEA.

Несаканите ефекти може да вклучуваат:

- Инфекција внатре во окото: Болка во окото или зголемен дискомфорт. Влошување на црвенилото на окото, осетливост на светлина, оток и промени на видот како ненадејно намалување на видот или заматување на видот.
- Заматување на леќата (катаракта): гледање на сенки, помалку јасни линии, форми и бои за разлика од претходно.
- Зголемување на очниот притисок: халоа околу светло, црвено око, гадење, повраќање и промени во видот.
- Раскинување (расцеп) или одлепување на слој од ретината: ненадајни блесоци на светлина, ненадајна појава или зголемување на бројот на витреални опацитети, завеса преку дел од видното поле и промени во видот.

Јавете му се на Вашиот лекар веднаш доколку мислите дека сте почувствувајте било кој од овие несакани ефекти.

За целосна листа на несаканите ефекти погледнете во Упатството за лекот.





ЖИВОТ со ОЦРВ

Дијагностирањето на ОЦРВ и започнувањето на проблемите со видот, можат да бидат вознемирувачки период за вас. Нормално е да сте загрижени и да се чувствувате несигурни за вашата иднина, но вашата дијагноза не значи дека веќе нема да можете да живеете исполнет живот. И понатаму можете да уживате со семејството, пријателите и во вашите интереси со некои мали промени.

Некои прилагодувања кои ќе Ви помогнат:

- Известете ги пријателите и семејството дека имате ОЦРВ и дека тоа влијае на Вашиот вид
- Користете посилна светлост
- Организирајте ја својата околина на начин што секој предмет ќе има свое место
- Носете со себе батериска светилка и лупа
- Читајте книги и весници напишани со букви со голем фонт и обидете се да слушате аудио книги

Поддршка за луѓето со ОЦРВ

Најважно од се е да запомните дека каде и да сте и колку и да сте афектирани од ОЦРВ не сте сами. Може да Ви е тешко да ја разберете вашата дијагноза или да ја прифатите истата. Разговорот со експерти може да ви помогне да најдете одговор на прашањата кои ги имате, разговорот со други личности кои имале или биле во слична ситуација како вашата може да Ви помогне да ја прифатите вашата дијагноза.



Забелешки



Вашиот водич за лекот ЕYLEA
(аудио ЦД)





Мојот следен закажан термин:

Датум: _____ Време: _____

Датум: _____ Време: _____

Датум: _____ Време: _____

Датум: _____ Време: _____

За сите сомневања за несакани ефекти од лекот треба да го известите својот лекар или фармацевт, односно друг здравствен работник со кого стапиле во контакт. Сите несакани ефекти, како и сомневања за неисправност во квалитетот на лекот, можете да ги пријавите и на Bayer doo Ljubljana, Претставништво Скопје, Ул. Антон Попов бр.1, лок. 4/мез./лам.2, 1000 Скопје, Македонија, тел. 02 / 3 124 055

