

Картичка за предупредување на пациентот

Xerdoxo - Ксердоксо 2,5 mg

Xerdoxo - Ксердоксо 10 mg

Xerdoxo - Ксердоксо 15 mg

Xerdoxo - Ксердоксо 20 mg



(штиклирајте го полето со  
препишаната доза)

- ◆ Секогаш чувајте ја оваа картичка при рака
- ◆ Покажете му ја оваа картичка на било кој лекар или стоматолог пред третманот



#### Информации за здравствените работници:

- ◆ Вредностите на INR не треба да се користат затоа што тие не се сигурен начин за мерење на антикоагулантното дејство на лекот Ксердоксо.

#### Што треба да знаете пред да го земете лекот Ксердоксо?

- ◆ Лекот Ксердоксо ја разредува крвта, со што ја спречува појавата на опасни згрутчувања на крвта (тромби).
- ◆ Лекот Ксердоксо мора да се зема точно онака како што е препишано од

страна на вашиот лекар. За да се обезбеди оптимална заштита од појавата на згрутчувања на крвта, **дозата никогаш не треба да се пропушта.**

- ◆ Не треба да прекинете со земањето на лекот Ксердоксо без претходно да се советувате со вашиот лекар, затоа што прекилот може да доведе до зголемување на ризикот од појава на згрутчување на крвта.
- ◆ Пред да ја започнете терапијата со лекот Ксердоксо, кажете му на вашиот лекар доколку во моментот земате, неодамна сте земале или пак имате намера да земате некој друг лек.
- ◆ Кажете му на вашиот лекар дека го земате лекот Ксердоксо пред да ви биде извршена операција или инвазивна постапка.

#### Кога треба да се советувам со мојот лекар?

При земање на лекови за разредување на крвта, како што е лекот Ксердоксо важно е да се биде свесен за неговите можни несакани дејства. Крварењето е најчестото несакано дејство. Немојте да започнете со земање на лекот Ксердоксо ако подлегнете на ризик од крварење, без претходно да се советувате со вашиот лекар. Веднаш кажете му на вашиот лекар, доколку ви се појават било какви знаци или симптоми на крварење, како што се следните:

- ◆ болка
- ◆ отекување или непријатност
- ◆ главоболка, вртоглавица или слабост
- ◆ невообичаени модрички, крварења од носот, крварење од непцата, исеченици за кои е потребно подолго време за да се запре крварењето
- ◆ менструално или вагинално крварење кое е потешко од вообичаеното
- ◆ крв во вашата урина која може да биде розова или кафена, црвени или црни столица
- ◆ искашлување на крв, или повраќање на крв или на материјал кој изгледа како талог од кафе



- Pantone 2144 C

- Pantone 2144 C (60%)



Article name.: PAC.XERDOXC - КСЕРДОКСО

MK

Prepared by: D. Primc

Date: 23 04 2024

### Како да го земам лекот Ксердоксо?

♦ За да се обезбеди оптимална заштита, Лекот Ксердоксо

- 2.5 mg може да се зема со или без храна
- 10 mg може да се зема со или без храна
- 15 mg мора да се зема заедно со храна
- 20 mg мора да се зема заедно со храна

### Во моментот сум на антикоагулантна терапија со лекот Ксердоксо (ривароксабан)

Име: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Датум на раѓање \_\_\_\_\_

Телесна тежина \_\_\_\_\_

Други лекови/состојби \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### При итен случај, ве молам да се извести:

Име на лекар: \_\_\_\_\_

Телефон на лекар: \_\_\_\_\_

Печат на лекар: \_\_\_\_\_

### Исто така, ве молам да се извести:

Име: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Однос: \_\_\_\_\_