

Adalitumtab

КАРТИЧКА ЗА ПОТСЕТУВАЊЕ ЗА ВОЗРАСНИ ПАЦИЕНТИ

Ова картичка претставува електронен материјал кој е изработен само употреба за спроведување на некои од сории обично употребите. Даваат информации за некои посебни аспектови од некои од сории обично употребите.

Даваат информации за некои посебни аспектови од некои од сории обично употребите.

Даваат информации за некои посебни аспектови од некои од сории обично употребите.

Болници пополнете ги Вашите информации и информациите за заполнете работните исклучени во Вашот непултески нефритически нега.

ПРИЈАЈУВАЊЕ НА НЕСАКАНИ ДЕСТВА

Доколку дозете некаквото несакано дејство, рат�отете со Вашот лекар, фармацевт или медицински сестра.

Ова вклучува и какви било нежелани несакани дејствија кон не најдени по употреба на употреба. Несаканите дејствија може да приведат директно пречку. Најчесто несаканите дејствија за фармакологички пријајувачи за лекови и лековници среќдите ул С. Кирин и М. Милорад бр 54, кот 1) или преку електронски пат преку веб-страницата на Агенцијата [http://nms.mhl.gov.mk](#) за податоци за лекови / фармакологички дејствија.

Агенцијата е обврзана исклучиво што, во случај на пријајувачите на несаканите дејствија, да го нападне заинтересираните лица и бројот на скрутира на некој.

Со пријајувачите на несаканите дејствија, пријајувачите кон обезбедуваат на пакет информации за бејзитета на овој лек.

Дополнително, несаканите дејствија може да ги прикажат и да иматат најдобро тоја стапка на некој пристап. ХЕМОДИЛАКАКОВЕТИ, ХЕМОДИЛАКАКОВЕТИ И ПД. Р. ОСО СКОПЈЕ, контакти: Столница Тодоровска, одделение за фармакологија, на тел: 070 328 537 и е-майл: dozov@hemoskopje.com.

Верзија 1, истекува во: 2024.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАС И ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ВКЛУЧУВАНИ ВО ЛЕКУВАЊЕТО И МЕДИЦИНСКАТА НЕГА

Тестирање и лекување за туберколоза (ТБ)

Означенето го квадратчето ако:

Некогаш сте биле тестирани за ТБ.

ДА
[Претпоставка: се вгради текот кога не е выбран]

Означенето го квадратчето ако некогаш сте имале практичен тест за ТБ:

ДА
[Претпоставка: се вгради текот кога не е выбран]

Означенето го квадратчето ако некогаш сте примил таблети за третман или превенција на ТБ:

ДА
[Претпоставка: се вгради текот кога не е выбран]

За податок информации: Ве молиме прочитате го упатството за употреба на некој. Ако имате дополнителни прашања, разговарајте со Вашите лекари или друг здравствен работник.

Верзија 1, истекува во: 2024.

ВЕЛИЧАШ ОБРАТЕТЕ СЕ КАЈ ВАШИОТ ЛЕКАР АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕКОЈ ОД СЛЕДОВИТЕ СИМПТОМИ НА ОВИЕ МОЖНИ СЕРИЗОНИ НЕСАКАНИ ДЕСТВА НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ:

ИФЕКЦИИ

Тревса, морилија, невробичено питење, паникот не се чувствува добро или невробичен замор, маџини или пазарни, болка по стомакот, туѓење на алерги или губење на телесна тежина, кашлица или искашливаче или спуз, недостасот на воздух, проблеми со уринирање, сплетена коса, ранки, болки во мускулите, проблеми со забита.

РАК

Нокни потеги, отекување на лимфните јади (отечени жадди), на вратот, пазуите, преноните или на други места, туѓење на телесна тежина, кови, кожни, леуми или промина на кистите на вените посочените кожни лезии (како бемки или пени), скривано чештаче кое што не може да се објасни.

НАРУШУВАЊА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ

Височиност или трънчење, промени на видот, мускулна слабост, новобјасната проптиглија.

Каквите му на Вашите лекар за кога новобјаснени симптоми кои не ги забележавате за време на лекувањето со лекот кој содржи адипимидаб. Овие не се сите можни симптоми на наведените несакани дејствија.

Верзија 1, истекува во: 2024.



Вакцинација

Можете на бидето вакциниран, ако имате со „живи вакцини“. Ако сте го примиште овој лек за првично на бројноста, вакцина е да го информираше лекарот на Вашот лекар пред да прими вакцината. Новороденчето не смее да приема „живи вакцини“ како вакцина. Новороденчето може да приема „живи вакцини“ 5 месеци по применето на последната инфекција на бебичкута. Новороденчето може да приема на бројноста.

- Целта на оваа картичка е да информира за некои од конкретите несаканите лекови на лековите кои сопстват ададимумаб.
- Следи од гермоините несакани лекови што може да се појават вирузите на лековите кои сопстват ададимумаб.
- Некој од гермоините несакани лекови што може да се појават вирузите на лековите кои сопстват ададимумаб.

ПРЕДА ЗАПОЧНЕТЕ ТЕРАПИЈА СО ЛЕКОВИ КОИ СОПРДЖАТ АДАДИМУМАБ

Информирајте го Вашот лекар за сите здравствени состояјби и проблеми што имате и сите лекови што ги земате. Тога ќе им помогне Вам и за Вашот лекар да отпуште дали овој лек е соодветен за Вас.

ИНФОРМИРАЈТЕ ГО ВАШОТ ЛЕКАР АКО ВИЕ:

- Ако имате инфекција или симптоми на инфекција (ако што се треска, тојава на ракче, замор, проблеми со забодување).
- Ако имате или претходно сте имале туберкулоза или сте биле во контакт со нејзин која има туберкулоза.
- Ако имате чувство на грешне или високанестезии или мигле како на проливи или се мигле рак.
- Ако сте проблеми со разговите со лекарот.

Пред да започнете терапија со овој лек, Вашите лекари треба да проверат дали имате или имате симптоми на туберкулоза. Можбите трески да отидат и симптомите на туберкулоза пред да починат и го примиште овој лек.

ИНФОРМИРАЈТЕ ГО ЛЕКАРОТ ЗА:

Сите Ваши нови медицински состојби.

Нови лекови кои ги земате.

Сите кортушки промедијари или оператори што се плинарираат.

КАЈ НЕКОМ ПУТЕ КОМ ПРИМААТ АДАДИМУМАБ
МОЖЕ ДА ИМААТ СЕРВИЗНА НЕСАКАНА ДЕЛСТВА,
ВКЛУЧУВАјќИ:

ИНФЕКЦИИ

Ададимумаб им помага на луѓето кои страдаат од одредени воспалителни болести. Помага со блокирање на един дел од индуцираниот систем. Меѓутоа, тој дел од индуцираниот систем исто така помага на организмот да биде против инфекции. Ова значи дека ададимумаб, може да биде напредни подлоги на нови инфекции или да ги влоши постостаните инфекции. Ова вклучува инфекции како што се настинки или сервозни инфекции како туберкулоза.

РАК

Доколку притмате некој кој содржи ададимумаб, може да се ангажиши ризикот да добие одредени видови на рак.

НАРУШУВАЊА НА НЕРВНИИОТ СИСТЕМ

Кој некој лије со разни нови или се влошивани постојаните нарушувања на нервниот систем. Ова вклучува и мултина спирала.

- Доколку се тојава несакано дистрофија на макулата и нервниот систем.
- Доколку се тојава несакано дистрофија на периферијата, која е најчесто за вакцините.
- Билежи несаканите дистрофији да се појават и по последната доза на вакцината ададимумаб, како и на вакцините на Вашот лекар. Овие дистрофији можат да се појават за време на лекуванието со ададимумаб.

Верзија 1, исполнетиј 2024.

Верзија 1, исполнетиј 2024.

Верзија 1, исполнетиј 2024.



Adalimumab

КАРТИЧКА ЗА ПОТСЕТУВАЊЕ ЗА ВОЗРАСНИ ПАЦИЕНТИ

Важни информации кои е потребно да ги запомните

Оваа картичка содржи важни безбедносни информации што треба да ги знаете пред и за време на третманот со некоја доза ададимумаб.

- Секоја носете ја оваа картичка со вас уште 4 месеци по последната примена инфекција од некој.
- Понаколе ја овада картичка на кој било лекар или здравствен работник кој е вклучен во Вашето лекуването.
- На задната страна на оваа картичка означените дали некој има билни тестирали за туберкулоза или сте примила терапија за туберкулоза.

Извор: Агенција за лекови и здравствени сектор, 2024.

Adalimumab

КАРТИЧКА ЗА ПОТСЕТУВАЊЕ ЗА ВОЗРАСНИ ПАЦИЕНТИ

Важни информации кои е потребно да ги запомните

Оваа картичка содржи важни безбедносни информации што треба да ги знаете пред и за време на третманот со некоја доза ададимумаб.

- Секоја носете ја оваа картичка со вас уште 4 месеци по последната примена инфекција од некој.
- Понаколе ја овада картичка на кој било лекар или здравствен работник кој е вклучен во Вашето лекуването.
- На задната страна на оваа картичка означените дали некој има билни тестирали за туберкулоза или сте примила терапија за туберкулоза.

Извор: Агенција за лекови и здравствени сектор, 2024.