

Информации за пациентите и здравствените работници

Thalidomide може да предизвика сериозни вродени дефекти или смрт кај нероденото бебе, затоа:

- Пациентките од женски пол со репродуктивен потенцијал мора секогаш да користат ефикасна контрацепција, а машките пациенти со бремени партнерки или партнерки со репродуктивен потенцијал кои не користат ефикасна контрацепција мора секогаш да користат презервативи (дури и ако мажот имал вазектомија).
- Пациентките од женски пол со репродуктивен потенцијал мора да прават тестови за бременост на секои 4 недели, пред секое препишување на рецепт, за да се потврди дека не се бремени, освен во случај на потврдена стерилизација на јајцеводите.
- Доколку пациентка или партнерка на пациент се сомнева дека е бремена, мора веднаш да го контактира **лекарот што го пропишал рецептот или нејзиниот матичен лекар.**

За целосни информации за несаканите дејства на thalidomide, пациентите треба да го прочитаат упатството за употреба што се наоѓа во пакувањето на лекот, а здравствените работници треба да го прочитаат збирниот извештај за карактеристиките на производот достапен на веб-страницата <https://malmed.gov.mk/регистар-на-лекови/>.

Април 2026 година

Верзија 1.0



Информации за здравствените работници:

Детали за рецептот

Дали пациентот бил советуван?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Проценка на репродуктивниот потенцијал:	WCBP / WNCBP / Машки пол
Доколку пациентката е жена со репродуктивен потенцијал (WCBP), дали користи ефикасна контрацепција?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Доколку пациентот е од машки пол, дали користи презерватив, ако е потребно?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>



Информации за здравствените работници:

Детали за препишување

Пополнет формулар за овластување за препишување мора да биде приложен кон секој рецепт за да се потврди дека пациентот продолжува да користи ефикасна контрацепција (доколку е потребно) и, во случај на пациентка од женски пол со репродуктивен потенцијал (WCBP), се прави тест за бременост на секои 4 недели пред секое препишување на рецепт за да се потврди дека не е бремена.



Информации за контакт во итен случај:

Контакт на лекар кој пропишува лекови во итни случаи:

Телефонски број во текот на работното време:



Телефонски број по работното време:

Април 2026 година

Верзија 1.0