

Телефонски број на аптекарот:

Меѓународен телефон на аптекарот:

Меѓународен телефон на аптекарата:

Датум на прво употребување на Aubagio®:

Меѓународен телефон на аптекарот:

КАРТИЧКА ЗА ПАЦИЕНТОТ

Оваа картичка за пациентот содржи важни безбедносни информации кои треба да ги знаете кога примате терапија со Aubagio®. За дополнителни информации прочитајте во упатството за пациентот во кутијата на лекот.



Општи совети

Ве молиме картичкава покажете му ја на секој доктор или здравствен работник вклучен во Вашата медицинска нега (на пр. во итни случаји).



Еднаш дневно
AUBAGIO®
(teriflunomide)^{14 mg} таблетки

SANOFI GENZYME



Важни несакани ефекти

Овој лек може да влијае врз функцијата на црниот дроб и одредени клетки во крвта кои се важни за да се изборите со инфекции. Затоа, мора да се направи крвна слика и да се измери крвен притисок пред почетокот на терапијата и редовно по почетокот.

Ако се појават некои од овие несакани ефекти, ве молиме веднаш консултирајте се со вашиот лекар:

- Кожата или белката на окото може да пожолти, да се јави темна урина, мачнина или повраќање и стомачни болки. Во ваков случај може да имате проблем со црниот дроб.
- Висока температура, тресење, студенило, потечени жлезди, намалено или болно мокрење, или конфузија. Во овој случај, можно е да имате инфекција.



Само за женски пациенти: Бременост

- Не земајте Aubagio ако сте бремена, или мислите дека можеби сте бремена. Вашиот доктор може да побара да направите тест за бременост за да биде сигурен.
- Додека користите Aubagio, користете соодветна контрацепција.
- Ако забремените или мислите дека сте бремена, **веднаш контактирајте со Вашиот лекар.**
- Во случај на бременост, Вашиот доктор може да ви предложи третман со одредени лекови за брзо и ефикасно отстранување на Aubagio од организмот.
- Исто така, треба да се консултирате со вашиот лекар ако планирате или во моментот доите.

