

**Pradaxa**  
dabigatran etexilate

КАРТИЦА ЗА  
ПАЦИЕНТИ СО  
ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Носете ја секогаш со себе картицата за пациенти со предупредувања
- Бидете сигурни дека ја користите најновата

 **Boehringer  
Ingelheim**



### Информации за пациентите за лекот Pradaxa®

#### За Вашата терапија

- Pradaxa® ја разредува крвта, со што спречува создавање на опасни крвни коагулуми. Земајте го лекот Pradaxa® редовно според упатствата на Вашиот лекар.
- Никогаш не пропуштајте доза и не го прекинувајте земањето на лекот Pradaxa® без да се консултирате со Вашиот лекар.
- Информирајте го Вашиот лекар дека го земате лекот Pradaxa® пред секој оперативен или инвазивен зафат кај кој може да се очекува појава на крварење (вадење на заб, гастроскопија итн.)
- Pradaxa® може да се зема со или без храна. Капсулата треба да се проголта цела, со чаша вода. Немојте да ја кршите, џвакате и не ги празнете пелетите од капсулата.

#### Кога да побарате совет од лекар

- Употребата на лекот Pradaxa® може да го зголеми ризикот од крварења. Веднаш информирајте



го Вашиот лекар ако забележите било кој од следните можни знаци и симптоми на крварење: оток, нелагодност, невообичаена болка или главоболка, вртоглавица, бледило, слабост, невообичаени модринки, крварење од носот, крварење од гингивите, невообичаено долготрајно крварење при посекотини, невообичаено менструално или вагинално крварење, крв во мокрача со промена на бојата во розеникава или светло кафена, црвена/црна столица, искашлување на крв, повраќање на крв или содржина налик на талог од кафе.

- Доколку паднете или се повредите во тек на употребата на лекот, посебно ако ја повредите главата Ве молиме веднаш побарајте медицинска помош.
- Ако почувствувате киселини, мачнина, повраќате, чувствувате нелагодност во желудникот, надуеност или болка во горниот дел на стомакот не го прекинувајте земањето на лекот Pradaxa® без да се консултирате со Вашиот лекар.



### Информации за здравствените работници во врска со лекот Pradaxa®

- Pradaxa® е перорален антикоагуланс кој делува по пат на директна инхибиција на тромбин.
- Во случај на хируршка или друга инвазивна постапка, можеби ќе мора привремено да се прекине примената на лекот Pradaxa® пред постапката.
- Во случај на големо крварење примената на лекот Pradaxa® мора веднаш да се прекине.
- Со оглед на тоа дека Pradaxa® воглавно се елиминира по пат на бубрезите, потребно е да се одржува соодветна диуреза. Pradaxa® може да се отстрани со дијализа.
- Специфичниот антагонист на дабигатран (Praxbind®) е достапен во ситуации кога е потребно брзо поништување на антикогулантното дејство на лекот Pradaxa® (видете Збирен извештај за особините на лекот Pradaxa® и за Praxbind®).



Почитувани,

Вашиот лекар Ви препорачал лечење со лекот Pradaxa®. Со цел безбедна примена на лекот Pradaxa® Ве молиме да ги погледнете следните важни информации.

Со оглед на тоа дека оваа Картица за предупредувања содржи важни информации за вашето лечење, Ве молиме да ја носите со себе во сите ситуации како би ги информирале здравствените работници дека го земате лекот Pradaxa®.



Ве молиме да го пополните овој дел или  
замолете го Вашиот лекар да го стори тоа.

### Информации за пациентот

\_\_\_\_\_

(Име на пациентот)

\_\_\_\_\_

(Датум на раѓање)

\_\_\_\_\_

(Индикација за антикоагулантна терапија)

\_\_\_\_\_

(Вредност на клиренс на креатинин пред  
вovedување на терапијата)

\_\_\_\_\_

(Дозирање на лекот Pradaxa®)

\_\_\_\_\_

(Датум на започнување со терапија)

