

<p>Картичка за предупредување за пациентите за не-онколошки индикации</p> <p>Картичка за предупредување за пациентите што примаат Rixathon со не-онколошки болести</p> <p>Зошто ми е дадена оваа картичка? Овој лек може да ви ја зголеми веројатноста за добивање на инфекции. Оваа картичка укажува на тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Што треба да знаете пред да примате Rixathon • Кои се симптомите на инфекција • Што треба да направите ако се сомневате дека имате инфекција. <p>Картичката на задната страна го содржи Вашето име, името на лекарот и телефонскиот број.</p> <p>Што треба да правам со оваа картичка?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Постојано чувајте ја картичката со вас - на пример во Вашиот паричник или чанта. • Покажете ја оваа картичка на секој лекар, медицинска сестра или стоматолог коишто ги посетувате, не само на специјалистот којшто ви го препишал Rixathon. <p>Чувајте ја оваа картичка со вас 2 години после последната примена доза на Rixathon. Ова е заради тоа што несаканите дејства може да се развијат и неколку месеци по последниот третман.</p> <p>Кога не треба да примам Rixathon? Не примајте Rixathon доколку имате активна инфекција или сериозен проблем со Вашиот имунолошки систем.</p> <p>Известете го Вашиот лекар или медицинска сестра доколку земате или сте земале лекови кои можат да влијаат врз вашиот имунолошки систем вклучувајќи и хемотерапија.</p> <p>Кои се знаците за добивање на инфекција? Внимавајте на следниве можни симптоми на инфекција:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Треска или упорна кашлица • Губење на телесна тежина • Болка без сте се повредиле • Општо чувство на слабост и непријатност. 	<p>Доколку имате некои од овие симптоми, веднаш известете го Вашиот лекар или медицинска сестра.</p> <p>Исто така, треба да ги известите за Вашиот третман со Rixathon.</p> <p>Што друго треба да знам? Многу ретко, Rixathon може да предизвика сериозна инфекција на мозокот, наречена "Прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија" или PML. Ова може да биде фатално.</p> <p>Симптомите на PML вклучуваат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Збунетост, губење на меморијата или проблеми со размислувањето • Губење на рамнотежата или промена во начинот на одење или зборување • Намалена сила или слабост на едната страна од телото • Заматен вид или губење на видот <p>Доколку имате некои од овие симптоми, веднаш известете го Вашиот лекар или медицинска сестра. Исто така, треба да ги известите за Вашиот третман со Rixathon.</p> <p>Каде можам да добијам повеќе информации? За повеќе информации погледнете го Внатрешното упатство за Rixathon кое се наоѓа во пакувањето.</p> <p>Датум на почеток на третманот и податоци за контакт: Датум на последна примена инфузија: _____</p> <p>Датум на прва примена инфузија: _____</p> <p>Име на пациентот: _____</p> <p>Име на лекарот: _____</p> <p>Податоци за контакт со лекарот: _____</p> <p>Кога одите кај Вашиот лекар секогаш носете со себе список на сите лекови кои ги примате. Ве молиме разговарајте со Вашиот лекар или медицинска сестра доколку имате било какви прашања во врска со информациите од оваа картичка.</p>
---	---

