

Име на лекарот:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Телефонски број:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Забелешки:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

© 2019 |
v3.0

Табела со закажани прегледи

Ве молиме користете ја оваа табела за да ги запишете датумите на закажаните термини со Вашиот лекар:

Датум на преглед	Употребена контрацепција	Тест за бременот	Потпис на лекар
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	
		<input type="checkbox"/> Позитивен <input type="checkbox"/> Негативен Датум:	



Картичка за потсетување на пациенти за Roaccutane®

▼ Овој лек подлежи на дополнително следење. Со тоа се овозможува брзо откривање на илкуп информации за безбедноста на лекот. Од здравствените работници се бара да пријават сèкаква значителна несакана реакција од овој лек. Несаканите реакции од лековите можат да се пријават во Националниот центар за Фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (УР, СР, Хрватска и Мексико) бр. 24 кат. II или во електронскиот пат преку веб-страницата на Агенцијата <http://online.dgvr.nl/>.

Roaccutane®
Isotretinoin



Roaccutane® не смее да се зема за време на бременост.

Roaccutane® може сериозно да наштети на неродено бебе ако го зема бремена жена.

Ако останете бремени или мислите дека сте бремени престанете да го примате лекот Roaccutane® и веднаш контактирајте го Вашиот лекар

Внимателно прочитајте го внатрешното упатство пред почеток на лекувањето.

Ако имате било какви прашања или недоумици околу примање на Roaccutane®, разговарајте со Вашиот лекар или фармацевт.

Што треба да направите ако може да останете бремени:

- 1 **Мора да употребувате најмалку 1 високо ефективен метод за контрацепција (како што е интраутеринско средство или имплант) или правилно да употребувате 2 ефективни методи за контрола на бременост кои функционираат на различни начини (како на пример орална контрацепција заедно со кондом) пред, за време и 1 месец по прекин на третманот.**

- 1 **Не смеете да останете бремени за време на примање на лекот Roaccutane®, или за време од 1 месец по прекин на лекувањето.**
- 1 **Мора да одите на редовни контролни прегледи и редовно да правите тестови за бременост:**
 - Пред да почнете со лекувањето, мора да направите тест за бременост, кој мора да е негативен.
 - За да се осигурате дека не сте бремени за време на лекувањето, мора редовно да правите тестови за бременост, идеално еднаш месечно. Исто така, треба да направите финален тест за бременост 1 месец по прекин на лекувањето.

Потсетник за мажи и жени

Овој лек е препишан само на Вас, не го делете со никој и вратете ги неискористените капсули во аптеката.

Картичка за потсетување на пациенти

Име на лекар:

.....

.....

.....

Телефонски број:

.....

Забелешки:

.....

