

82 mm ± 0,5 mm

direction of reading PhC

Картичка за предупредување на пациентот

Xerdoxo - Kсердоkсо 2,5 mg

Xerdoxo - Kсердоkсо 10 mg

Xerdoxo - Kсердоkсо 15 mg

Xerdoxo - Kсердоkсо 20 mg

(штиклирајте го полето со препишаната доза)



XXXXXX

- ♦ Секогаш чувајте ја оваа картичка при рака
- ♦ Покажете му ја оваа картичка на било кој лекар или стоматолог пред третманот



**Информации за здравствените работници:**

- ♦ Вредностите на INR не треба да се користат затоа што тие не се сигурен начин за мерење на антикоагулантното дејство на лекот Kсердоkсо.

**Што треба да знаете пред да го земете лекот Kсердоkсо?**

- ♦ Лекот Kсердоkсо ја разредува крвта, со што ја спречува појавата на опасни згрутчувања на крвта (тромби).
- ♦ Лекот Kсердоkсо мора да се зема точно онака како што е препишано од

страна на вашиот лекар. За да се обезбеди оптимална заштита од појавата на згрутчувања на крвта, дозата никогаш не треба да се пропушта.

- ♦ Не треба да прекинете со земањето на лекот Kсердоkсо без претходно да се советувате со вашиот лекар, затоа што прекинетот може да доведе до зголемување на ризикот од појава на згрутчување на крвта..
- ♦ Пред да ја започнете терапијата со лекот Kсердоkсо, кажете му на вашиот лекар доколку во моментот земате, неодамна сте земале или пак имате намера да земате некој друг лек.
- ♦ Кажете му на вашиот лекар дека го земате лекот Kсердоkсо пред да ви биде извршена операција или инвазивна постапка.

**Кога треба да се советувам со мојот лекар?**

При земање на лекови за разредување на крвта, како што е лекот Kсердоkсо важно е да се биде свесен за неговите можни несакани дејства. Крварењето е најчестото несакано дејство. Немојте да започнете со земање на лекот Kсердоkсо ако подлежите на ризик од крварење, без претходно да се советувате со вашиот лекар. Веднаш кажете му на вашиот лекар, доколку ви се појават било какви знаци или симптоми на крварење, како што се следните:


- ♦ отекување или непријатност
- ♦ главоболка, вртоглавица или слабост
- ♦ невообичаени модринки, крварења од носот, крварење од непцата, исеченици за кои е потребно подолго време за да се запре крварењето
- ♦ менструално или вагинално крварење кое е потешко од вообичаеното
- ♦ крв во вашата урина која може да биде розова или кафена, црвени или црни столици
- ♦ искашлување на крв, или повраќање на крв или на материјал кој изгледа како талог од кафе



direction of reading PhC

PAC.XERDOXO - KСЕРДОКСО МК side 1.

216 mm ± 0,5 mm



Black U

Black U (60%)

Pantone Pink U

Pantone Pink U (60%)

side 1: VARNISHED AREA

side 2: UNVARNISHED AREA



Article No.: XXXXXX

Article name: PAC.Xerdoxo - Kсердоkсо МК

Dimension: (36+36+36+36+36+36) ± 0,5 mm x 82 ± 0,5 mm

Material: Menovo

PhC No.: XXX

Measure: 1:1

Datum: 02.07.2020

Prepared by: A. Mohorič

Checked by: I. Korbar

Packaging Design

**Како да го земам лекот Ксердоксо?**

- ◆ За да се обезбеди оптимална заштита, Лекот Ксердоксо
  - 2,5 mg може да се зема со или без храна
  - 10 mg може да се зема со или без храна
  - 15 mg мора да се зема заедно со храна
  - 20 mg мора да се зема заедно со храна

**Во моментот сум на антикоагулантна терапија со лекот Ксердоксо (ривароксабан)**

Име: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Датум на раѓање: \_\_\_\_\_ Телесна тежина: \_\_\_\_\_

Други лекови/состојби: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**При итен случај, ве молам да се извести:**

\_\_\_\_\_ Телефон на лекар: \_\_\_\_\_

Име на лекар: \_\_\_\_\_

Печат на лекар: \_\_\_\_\_

**Исто така, ве молам да се извести:**

\_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

Име: \_\_\_\_\_

Однос: \_\_\_\_\_

