

**Контакт податоци на лекарот**  
(кој го препишал лекот YERVOY®)

Име на лекарот

Број на телефон на ординацијата

Број на телефон за повици надвор од работното време

**Мои контакт податоци**

Мое име и број на телефон

Старател, име и број на телефон (за итни случаи)



**ВАЖНИ информации за здравствените работници**

- Овој пациент прима YERVOY® (ipilimumab) како монотерапија.
- Имунолошки посредувани несакани дејства можат да се јават било кога во тек на терапијата или месеци по нејзиниот прекин.
- Рана дијагноза и соодветен третман се од клучно значење за минимизирање на животна-загрозувачките компликации.
- Консултација со онколог или други лекари специјалисти може да помогне во справувањето со орган-специфични имунолошко посредувани несакани дејства.
- За повеќе информации за лекот YERVOY® здравствените работници треба да го прочитаат Збирниот извештај за особините на лекот достапен на <https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/overview> или да го контактираат носителот на одобрението за ставање на лек во промет на телефон: 02 3286 400 или e-пошта: [medinfo.northmacedonia@swixxbiopharma.com](mailto:medinfo.northmacedonia@swixxbiopharma.com).



Здравствениот работник кој го препишал лекот YERVOY® треба да го пополни делот "Контакт податоци на лекарот" во оваа Картичка со предупредувања за пациентот.

**YERVOY®**  
**(ipilimumab)**

Картичка со предупредувања за пациентот

Образец УЗ 0 - 24.07.2020  
731-MK-2300001.D.D.MM.YYYY





## Важни информации за пациентите

Секогаш носете ја картичката со вас за да ги информирате здравствените работници дека го примате лекот YERVOY® како монотерапија.

 Доколку имате било какви знаци или симптоми, веднаш известете го вашиот лекар.

### МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА



#### ЦРЕВА И ЖЕЛУДНИК

- дијареја (водени, ретки или меки столица), крвави или темно-пребоени столица
- почеста перисталтика на црева од вообичаено
- болка или осетливост во желудникот или стомакот, гадење, повраќање



#### ЦРН ДРОБ

- жолта пребоеност на очите или кожата (жолтица)
- болка во десната страна на стомакот
- темна пребоеност на урината



#### КОЖА

- кожен осип со или без чешање, сува кожа
- пликови и/или лупење на кожата, афти во устата
- отекување на лицето или лимфните жлезди



#### ОЧИ

- црвенило во окото
- болка во окото
- проблеми со видот или заматен вид



#### НЕРВИ

- мускулна слабост
- вкочанетост или трнење во рацете, стапалата или лицето
- вртоглавица, губење на свест или тешкотии при будењето



#### ОПШТИ СИМПТОМИ

- покачена телесна температура, главоболка, умор
- крварење
- промени во однесувањето (на пр. намалена сексуална желба, раздразливост или заборавеност)
- дехидратација, низок крвен притисок, шок

## Пријавување на несакани дејства

Ако добиете некое несакано дејство **разговарајте со вашиот лекар**. Ова ги вклучува и сите можни несакани дејства кои не се наведени во упатството за пациентот. Несаканите дејства од лековите може да ги пријавите и во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул.Св.Кирил и Методиј бр.54 кат 1) или по електронски пат преку веб страната на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/> или до носителот на одобрието за ставање на лекот во промет во Република Северна Македонија: Амикус Фарма д.о.о.е.л, бул. Партизански Одреди бр. 62 ламела Ц, мезанин бр. 3, влез 1, 1000 Скопје, Северна Македонија, одговорно лице за фармаковигиланца: Ксенија Мицкова Димитрова, телефон: 070 276 973, е-пошта: [kсенија.mickova-dimitrova@swixxbiopharma.com](mailto:kсенија.mickova-dimitrova@swixxbiopharma.com). Со пријавување на несаканите дејства можете да помогнете во обезбедувањето на повеќе информации за безбедноста на овој лек.



### ВАЖНО

- Информирајте го лекарот за сите претходни болести.
- Раниот третман на несаканите дејства ја намалува веројатноста за привремен или траен прекин на терапијата со лекот YERVOY®.
- Знаците и симптомите кои изгледаат благи можат бргу да се влошат доколку не се третираат.
- НЕ се обидувајте да ги третирате симптомите самостојно.
- Знаците и симптомите можат да бидат одложени и можат да се јават недели или месеци по последната инјекција YERVOY®.

За дополнителни информации прочитајте го упатството за употреба за лекот YERVOY®, кое се наоѓа во секое пакување на лекот или на <https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/overview>.