

Картичка со предупредувања за пациентот

Ривароксабан Тева 10 mg ☐

Ривароксабан Тева 15 mg ☐

Ривароксабан Тева 20 mg ☐

- Имајте ја оваа картичка со себе во секој момент
- Покажете ја оваа картичка на својот лекар или стоматолог, пред лекувањето

Јас сум на антикоагулантна терапија со лекот Ривароксабан Тева (ривароксабан)

Име и презиме:

Адреса:

Датум на раѓање:

Телесна тежина:

Други лекови/состојби:

При итна состојба, Ве молам информирајте:

Име и презиме на лекарот:

Број на телефон на лекарот:

Факсимил на лекарот:

Ве молам, исто така информирајте:

Име и презиме:

Број на телефон:

Сродство:

Информација за лекарите:

Вредностите на INR не би смееле да се користат затоа што не се сигурна мерка за антикоагулантната активност на лекот Ривароксабан Тева.

Што треба да знам за лекот Ривароксабан Тева?

- Ривароксабан Тева ја разређува крвта и така Ве штити од создавање на опасно згрутчување на крвта
- Ривароксабан Тева треба да го земате точно според упатствата на лекарот. За да се обезбеди оптимална заштита од згрутчување на крвта, **никогаш немојте да ја пропуштите дозата од лекот.**
- Не смеете да прекинете со земање на Ривароксабан Тева без претходна консултација со лекарот, затоа што може да се зголеми ризикот од создавање на тромб.

- Информирајте го својот лекар доколку користите било кои други лекови или ако неодамна сте ги користеле или имате намера да почнете да ги користите, пред да почнете да земате Ривароксабан Тева.
- Информирајте го лекарот дека земате Ривароксабан Тева пред било каква операција или инвазивна постапка.

Кога треба да побарам совет од лекар?

При користење на антикоагулантни лекови како што е Ривароксабан Тева, важно е да се биде свесен за појава на несакани ефекти. Крварењето е најчест несакан ефект. Не започнувајте со терапија со Ривароксабан Тева **без** претходен договор со лекарот, доколку знаете дека сте изложени на зголемен ризик од крварење. Веддаш известете го својот лекар доколку имате некои од знаците и симптомите на крварење, како што се:

- болка
- отоци или непријатност
- главоболка, вртоглавица или слабост
- невообичаено создавање на модрици, крварење од нос, крварење од непца, рани на кои им треба подолго време да престанат да крварат
- пообилно од вообичаеното менструално крварење или вагинално крварење
- крв во урина која може да биде розева или кафена, црвен или црн измет
- искашлување на крв или повраќање крв или содржина која наликува на талог од црно кафе

Како да употребувате Ривароксабан Тева?

- За да се обезбеди оптимална заштита, Ривароксабан Тева:
 - 10 mg може да се зема со храна или без неа
 - 15 mg мора да се зема со храна
 - 20 mg мора да се зема со храна

Пријавување на несакани реакции

Доколку забележите било какви несакани реакции треба да го известите Вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ова ги вклучува и сите можни несакани реакции кои не се наведени во упатството за употреба на лекот. Несаканите реакции од лекот можете да ги пријавите во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 кат 1) или по електронски пат преку веб страната на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/> Дополнително, секој сомнеж за несакани реакции од лекот може да го пријавите и до носителот на одобрението за ставање на лекот во промет: ПЛИВА ДООЕЛ – Скопје кај Весна Симонова одговорно лице за фармаковигиланца на е-пошта: safety.macedonia@tevapharm.com и тел: 070/230686