

—Teréfóchkn Gpój ha ntekapot: —
Nme n upé3nme ha ntekapot: —
Nme ha 3Apabctbehta yctahobas:
Latym ha upboto upomnubyahé
Nme n upé3nme ha na4ngetot: —

Картичка за пациенти за лекови кои содржат терифлуномид

Оваа картичка претставува едукативен материјал кој е задолжителен како услов за ставање во промет на лекови кои содржат терифлуномид, со цел дополнително да се минимизираат важните избрани ризици. Не содржи промотивна содржина.

Информациите наведени во овој едукативен материјал не ги заменуваат оние дадени во упатството за употреба на лекот, кое е вклучено во секое пакување на лекот кој содржи терифлуномид. За целосни информации пред употреба на лекот, прочитајте го упатството за употреба на лекот (достапно во секое пакување на лекот и на следниов линк <https://lekovi.zdravstvo.gov.mk>).

Овој едукативен материјал можете да го најдете на веб-страницата на Агенцијата за лекови и медицински средства - МАЛМЕД во делот Вигиланца/Фармаковигиланца/Безбедносни информации за лекови/Управување со ризик.

Картичката за пациенти содржи **важни безбедносни информации** за кои треба да знаете кога се користи лек кој содржи терифлуномид. За повеќе информации, Ве молиме прочитајте го упатството за лекот.



ОПШТИ СОВЕТИ

Ве молиме покажете ја оваа картичка на секој лекар или здравствен работник кој е вклучен во Вашата медицинска нега (на пр. во случај на итна медицинска помош).

верзија 1; декември, 2023.



Важни несакани дејства

Овој лек може да влијае на функцијата на црниот дроб, крвниот притисок и одредени крвни зрнца кои се важни за борба против инфекции.

Доколку почувствуваат некој од следниве несакани дејства, веднаш контактирајте го Вашиот лекар:

- Пожолтување на кожата или белките на очите, темна урина, гадење или повраќање и абдоминална болка. Во овој случај, може да имате проблем со црниот дроб.
- Висока температура, кашлица, треска, отечени жлезди, намалено или болно мокрење. Во овој случај, може да имате инфекција.



За жени во репродуктивна возраст, вклучително и девојчиња и нивните родители/старатели

- Не започнувајте третман со лек кој содржи терифлуномид доколку сте бремени или мислите дека сте бремени. Вашиот лекар може да побара од Вас да направите тест за бременост за да ја провери можноста за бременост. Користете ефективни контрацептивни мерки за време и по третманот со лек кој содржи терифлуномид. Вашиот лекар ќе Ве советува за потенцијалните ризици за фетусот и потребата од ефикасна контрацепција.
- Обратете се на Вашиот лекар ако сакате да го промените методот на контрацепција или ако сакате да забремените.
- Ако забремените или мислите дека сте бремени, престанете да користите терифлуномид и **веднаш обратете се на Вашиот лекар**.
- Во случај на бременост, Вашиот лекар може да препорача терапија со одредени лекови за да се забрза отстранувањето на терифлуномидот од Вашето тело.
- Исто така, треба да разговарате со Вашиот лекар ако доите или планираате да дојте.
- За родители/старатели или девојчиња: Ве молиме контактирајте го Вашиот лекар кога пациентката ќе добие прва менструација за совет за потенцијалниот ризик за фетусот и потребата од контрацепција.

